

Blaue Karte für Personen mit Li-Fraumeni-Syndrom (LFS)



Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen

Für alle Personen mit LFS, beginnend ab klinischer oder genetischer Diagnosestellung, lebenslang
(Clin Cancer Res 2025; aktualisierte AACR-Empfehlungen)

Kinder (Geburt bis 18 Jahre)	Erwachsene
• Gründliche körperliche Untersuchung alle 3–4 Monate • Bei neuen Beschwerden sofort ärztliche Abklärung • Jährlich Ganzkörper-MRT • Jährlich MRT des Kopfes • Ultraschall von Bauch und Becken alle 3–4 Monate • Falls Ultraschall-Bildqualität unzuverlässig: Blutuntersuchung bestimmter Hormone • Jährliche Hautuntersuchung • Nach bestimmter Chemotherapie zusätzlich regelmäßige Blutbildkontrollen	• Gründliche körperliche Untersuchung alle 6 Monate • Bei neuen Beschwerden sofort ärztliche Abklärung • Jährlich Ganzkörper-MRT • Jährlich MRT des Kopfes • Ultraschall von Bauch und Becken alle 6 Monate • Magen- und Darmspiegelung alle 2–5 Jahre ab dem 25. Lebensjahr oder früher bei entsprechender familiärer Vorgeschichte • Jährliche Hautuntersuchung • PSA-Bluttest zur Früherkennung von Prostatakrebs ab 35 Jahren • Nach bestimmter Chemotherapie zusätzlich regelmäßige Blutbildkontrollen <i>Zusätzlich für Frauen</i> • Risikobewusstsein für Brustkrebs • Anleitung zur Brustselbstuntersuchung ab 18 Jahren • Klinische Brustuntersuchung zweimal jährlich ab 20. Lebensjahr • Jährlich Brust-MRT (von 20-75 Jahre)¹ ¹Brust-MRT sowie Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane und des Beckens sollte sich mit der jährlichen Ganzkörper-MRT abwechseln (mindestens ein Scan alle 6 Monate)