

Früherkennungsempfehlungen

Für alle Personen mit LFS, beginnend ab klinischer oder genetischer Diagnosestellung, lebenslang
(Clin Cancer Res 2025; aktualisierte AACR-Empfehlungen, Details:

<https://aacrjournals.org/clincancerres/article/31/10/1831/762214/Update-on-Cancer-Screening-Recommendations-for>

Kinder (Geburt bis 18 Jahre)	Erwachsene
• Vollständige körperliche Untersuchung alle 3–4 Monate, einschließlich Blutdruckmessung, Wachstumskurve und neurologischer Untersuchung • Sofortige Abklärung neuer Symptome • Jährlich Ganzkörper-MRT (einschließlich Extremitäten) • Jährlich Schädel-MRT (zunächst mit Kontrast, danach ohne, sofern vorige MRT unauffällig und keine neuen Aspekte) • US Abdomen und Becken alle 3–4 Monate • Bei unzureichender US-Qualität: Gesamt-Testosteron, Dehydroepiandrosteronsulfat und Androstendion • Jährliche dermatologische Untersuchung • Blutbild mit Differentialblutbild alle 3–4 Monate nur nach vorheriger Behandlung mit leukämieauslösender Chemotherapie	• Vollständige körperliche Untersuchung einschließlich Extremitäten alle 6 Monate • Sofortige Abklärung neuer Symptome • Jährlich Ganzkörper-MRT (einschließlich Extremitäten) • Jährlich Schädel-MRT (zunächst mit Kontrast, danach ohne, sofern vorige MRT unauffällig und keine neuen Aspekte) • US Abdomen und Becken alle 6 Monate (kann entfallen, wenn zeitgleich Ganzkörper-MRT erfolgt) ¹ • Obere Endoskopie und Koloskopie alle 2–5 Jahre; Beginn mit 25 Jahren oder 5 Jahre vor dem frühesten familiären gastrointestinalen Karzinom; nach adenomatösem Polyp jährlich • Jährliche dermatologische Untersuchung • PSA jährlich ab 35 Jahren • Blutbild mit Differentialblutbild alle 3–4 Monate nur nach vorheriger Behandlung mit leukämieauslösender Chemotherapie <i>Zusätzlich für Frauen</i> • Brustkrebs-Risikobewusstsein • Anleitung zur Brustselbstuntersuchung ab 18 Jahren • Klinische Brustuntersuchung zweimal jährlich (ab 20 Jahre) • Jährlich Brust-MRT (20-75 Jahre) ¹ • Risikominimierende bilaterale Mastektomie erwägen ¹Brust-MRT/ US Abdomen+Becken mit jährlicher Ganzkörper-MRT möglichst abwechseln (mindestens ein Scan alle 6 Monate)